

# حل یک قضیه قدیمی و مهم از راهی بسیار ساده


در مثلث متساوی الساقین، نیم‌سازهای داخلی نظیر زاویه‌های قاعده با هم برابرند.

اثبات این قضیه بسیار ساده است. اما عکس این قضیه یعنی: «اگر در مثلثی دو نیم‌ساز داخلی برابر باشند، آن مثلث متساوی الساقین است»، اصلاً آسان نیست. در واقع بیش از ۲۰ قرن این قضیه حل نشده باقی ماند تا اینکه در قرن هفدهم مهندسی فرانسوی به نام **دسکوپ** آن را حل کرد. پس از این راه حل نیز به نظر می‌رسید که راه حل دیگری برای آن به دست نیاید، اما چنین نبود. بعدها چندین راه حل برای این قضیه یافت شد.

در ایران مترجم نامی، مرحوم **احمد آرام** آن را حل کرده است. در اینجا راه‌حلی را که شاید ساده‌ترین راه اثبات این قضیه باشد، می‌آوریم و می‌خواهیم این نکته را مطرح کنیم که غالباً اثبات یک قضیه، به‌عنوان نتیجه یک قضیه قبلاً اثبات شده، از اثبات مستقیم آن آسان‌تر است.

■ در هر مثلث نیم‌ساز زاویه بزرگ‌تر، از نیم‌ساز زاویه کوچک‌تر، کوچک‌تر است.

● **حل:** اگر در مثلث ABC زاویه B بزرگ‌تر از زاویه C و اضلاع BD و CE نیم‌ساز این زاویه‌ها باشند، از B و روی BD زاویه‌ای مساوی زاویه C جدا می‌کنیم تا AC را در F قطع کند.



اگر H و G نقاط برخورد BD و BF با CE باشند، دو مثلث FCG و FBD متشابه‌اند (زیرا زاویه‌هایشان مساوی است) و داریم: BF: CF=BD: CG. در مثلث BFC زاویه رأس C از زاویه رأس B کمتر است، پس: BF < CF. به تناسب فوق باید BD < CG باشد و چون CG < CE است، پس BD < CE می‌شود.

**نتیجه:** اگر در مثلثی دو نیم‌ساز مساوی باشند، مثلث متساوی الساقین است. (چگونه؟ از برهان خلف استفاده کنید.) مسئله برای دو نیم‌ساز خارجی صدق نمی‌کند.

روش بازآفرینی را بتوانیم به‌کار ببندیم که در مراحل محاسبه (و پس از استفاده از اتحادها، روابط و محاسبات) به نوعی به‌صورت اولیه سؤال (تابع) داده شده بازگردیم (که در ۲ نمونه اخیر مشاهده شد). در پاسخ سؤال دوم باید متذکر این نکته شد که تغییر متغیر باید هدف ما را که **تکرار صورت مسئله** است (بازآفرینی) دربرگیرد. در مثال  $f(x) = \frac{x - \sin x}{x^3}$ ، با تغییر  $x = 3t$  و توجه به اینکه  $\sin 3t = 3 \sin t - 4 \sin^3 t$  وجود  $3 \sin t$  و  $3t$  را در صورت کسر تغییر یافته، به‌دنبال دارد که خود دسترسی به هدف را تضمین می‌کند.

در تلاش برای تکمیل موضوع و پاسخ به پرسش «چه تابعی؟ چه تغییر متغیری؟»

آموخته است که حتی تغییر متغیر  $x = 2t$  برای محاسبه  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{x^3}$  نیز به بازآفرینی و دریافت پاسخ می‌انجامد!

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{x^3} = \beta, \quad x = 2t$$

$$\beta = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{2t - \sin 2t}{8t^3} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{2t - 2 \sin t \cos t}{8t^3}$$

$$= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t - \sin t \cos t}{4t^3}$$

$$\beta = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t - \sin t(1 - 2 \sin^2 \frac{t}{2})}{4t^3}$$

$$\Rightarrow \beta = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{(t - \sin t) + (2 \sin t \sin^2 \frac{t}{2})}{4t^3}$$

$$\Rightarrow \beta = \frac{1}{4} \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t - \sin t}{t^3} + \frac{1}{2} \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin t \cdot \sin^2 \frac{t}{2}}{t^3}$$

$$\beta = \frac{1}{4} \beta + \frac{1}{2} (\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin t}{t}) (\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin^2 \frac{t}{2}}{t^2})$$

$$\Rightarrow \beta = \frac{1}{4} \beta + \frac{1}{2} (1) (\frac{1}{4}) \Rightarrow \frac{3}{4} \beta = \frac{1}{8} \Rightarrow \beta = \frac{1}{6}$$

### تمرین:

را به روش بازآفرینی و با تغییر  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \tan x}{x^3}$  متغیر  $x = 2t$  به‌دست آورید.